



FLINT® MAX
75 WG

ΦΛΙΝΤ ΜΑΞ 75 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Flint Max 75 WG είναι μίγμα δυο μυκητοκτόνων με προστατευτική και θεραπευτική δράση: του trifloxystrobin που εμφανίζει διαλασματική και τοπικά διασυστηματική κίνηση καθώς και αξιόλογη δράση με ατμούς και του tebuconazole που εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρουμπλουρινών με διαλασματική δράση. Οι στρουμπλουρίνες παρεμποδίζουν τη μεταγονιδιακή αντιστή, διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα. Το tebuconazole σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΑΜΠΕΛΙ (Εμπραπέζες ποικιλίες): Ωίδιο (*Erysiphe necator*). Προληπτική/Θεραπευτική ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι το τέλος της άνθησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. **Δόση:** 18-20 γρ./100 λίτρα νερού (18-20 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Ωίδιο (*Erysiphe necator*). Προληπτική/Θεραπευτική ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι την έναρξη χρωματισμού των σαγών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. **Δόση:** 18-20 γρ./100 λίτρα νερού (18-20 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΜΗΛΙΑ: Φουζίκκωδο (*Venturia inaequalis*), Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*), Αλτερνάρια (*Alternaria alternata*). Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ: Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*). Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
• Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2. • Δαμασκηλιά, Κερασιά: 3.
Μανιλά (*Monilia spp*). Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** • Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2. • Δαμασκηλιά, Κερασιά: 3.

Εξίσκακος της Ροδάκινιάς (*Taphrina deformans*). Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

- Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2. • Δαμασκηλιά, Κερασιά: 3.

ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο (*Sporosaea oleagina*).

Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. **Δόση:** 20 γρ./100 λίτρα νερού (25 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 125 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΠΙΠΕΡΙΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):

Ωίδιο (*Leveillula taurica*). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. **Δόση:** 20-30 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθριες: 100 λίτρα/στρέμμα. Θερμοκήπιο: 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΑΙΤΟΥΡΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΠΕΠΟΝΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΚΟΛΟΚΥΘΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):

Ωίδιο (*Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum*). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. **Δόση:** 20-30 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Υπαίθριες: 100 λίτρα/στρέμμα. Θερμοκήπιο: 150 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
2. Σε περίπτωση υψηλής προβλεπής χρησιμοποίηστε το Flint Max στην υψηλή του δόσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
• Αμπέλι (Εμπραπέζες ποικιλίες): Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης.
• Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες • Μηλιά, Αχλαδιά: 14 ημέρες.
• Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά: 7 ημέρες. • Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: 3 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Εφαρμόστε το Flint Max 75 WG προληπτικά πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
- Εφαρμόστε το Flint Max 75 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.
- Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο υψηλότερη του 80%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά σκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθέτουμε σε σημεία αυτών για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



FLINT® MAX
75 WG



FLINT® MAX
75 WG

60gre

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (Υ.Α.Α.Τ.):60405/07-02-2014

Εναιωρηματοποιησιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση: Δραστική ουσία: tebuconazole 50% β/β, trifloxystrobin 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 21,4% β/β



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων

με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- Ύψοπο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβryo.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
- Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς, ABEE
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



BONUS STICKER



5 *200309*865477*

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr



ΠΡΟΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή θέση (επιλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα σωστά. Σε περίπτωση εισπνοής:

Μετακινήστε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ήρετο και σε ηρεμία. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε επιμελώς με πολύ νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethylenglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλεφάρια.

Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέτε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Πληροφορίες για το Γιατρό:
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης, η πλήρης απομάκρυνση θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης ποσότητας μόνο εντός των δύο πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θετικού νατρίου ουστηγεται πάντα.

Περιέχει trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Επισκευθείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέτε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων Bayer Ελλάς.
800 1135 333
από κινητό: 210 6166 332

GR84462756B