



Luna[®] EXPERIENCE

500ml e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 60.353 - 13/3/2013

LUNA EXPERIENCE SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/ο, tebuconazole 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



**BONUS
STICKER**

BayWin
Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Λούνα Εξήριπνες SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το μυκητοκτόνο Luna Experience SC είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του tebuconazole. Το fluopyram παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύνπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρά παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου. Το tebuconazole είναι δισυσταμιακό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλώσεως του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): **Όδιο** (*Uncinula necator*). Εφαρμογές από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων μέχρι την πλήρη ωρίμανση. **Δόση:** 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (12-40 κ.εκ./ στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-100 λίτρα/στρέμμα.

Μηλιά - Αχλαδιά: **Όδιο** (*Podospaera leucotricha*), **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium vesicarium*), **Αλτερνάρια** (*Alternaria* spp.). Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (20-75 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα.

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα. **Φαιά σήψη** (*Monilia* spp.): **Δόση:** 42-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (63-75 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Όδιο** (*Sphaerotheca pannosa*). **Δόση:** 33,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (49,5 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Σπαράγγι: Σκωρίση (*Puccinia asparagi*). Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή στην ανεπτυγμένη υπέργεια βλάστηση. **Δόση:** 75 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου): Σκωρίση (*Puccinia allii*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium* sp.). Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Το

προϊόν είναι αποτελεσματικό σε μικρή έως μέτρια προσβολή. **Δόση:** 60-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-80 λίτρα/στρέμμα.

Πράσο (χρήση ήσσονος σημασίας): Στεμφύλιο (*Stemphylium vesicarium*), **Σκωρίση** (*Puccinia allii*). Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι το τέλος της ανάπτυξης (το στελεχος έχει αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία μήκος και διάμετρο). **Δόση:** 60-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-80 λίτρα/στρέμμα.

Κρεμμυδάκι Χλωρό (χρήση ήσσονος σημασίας): Όδιο (*Leveillula taurica*), **Σκωρίση** (*Puccinia allii*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium vesicarium*). Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. **Δόση:** 60-100 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-80 λίτρα/στρέμμα.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 3/12-14

Μηλιά - Αχλαδιά: 2/7-10

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: Φαιά σήψη (*Monilia* spp.): 2/7-14, Όδιο (*Sphaerotheca pannosa*): 3/14

Σπαράγγι: 2/10-14

Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου), Πράσο (χρήση ήσσονος σημασίας), Κρεμμυδάκι Χλωρό (χρήση ήσσονος σημασίας): 1/-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του πράσου και στο χλωρό κρεμμυδάκι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες

Μηλιά - Αχλαδιά: 14 ημέρες

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: 3 ημέρες

Σπαράγγι: -

Κρεμμύδι - Σκόρδο: 7 ημέρες

Πράσο: 14 ημέρες

Κρεμμυδάκι χλωρό: 7 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -
- Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργιών που ακολουθούν: Ως ακόλουθες καλλιέργειες να μην φυτεύονται δενδρώδεις καλλιέργειες και λαχανικά.
- Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εισερχονται στις περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια εκτός αν φορούν προστατευτική ενδυμασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΞΥΡΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με σχίσμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνθήκες συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40° C.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από στύχημα: Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορριψίτε τα με ασφάλεια. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχουν, με polyethylenglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκοάσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα.

Καλλιέργειες για το γιατρό: Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer

από σταθερό: **800 1135 333**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

• Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Μακριά από παιδιά • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Φορέστε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. • Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς.

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18 - 20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr



GR80505515C



5 200309 889770 >



Luna[®]

EXPERIENCE

500ml e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 60.353 - 13/3/2013

LUNA EXPERIENCE SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/ο, tebuconazole 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΠΡΟΣΟΧΗ



BayWin

Πρόγραμμα Επιβράβευσης



Luna
EXPERIENCE

200ml e

LUNA EXPERIENCE SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/ο, tebuconazole 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 60.353 - 13/3/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ



**BONUS
STICKER**

BayWin
Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

200

100

Λούνα Εξπέριενς SC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το μυκητοκτόνο Luna Experience SC είναι μίγμα της νέας δραστικής ουσίας fluopyram και του tebuconazole.

Το fluopyram παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρά παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου.

Το tebuconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρά παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): **Οΐδιο** (*Uncinula necator*). Εφαρμογές από το στάδιο των 5 πραγματικών φύλλων μέχρι πριν την πλήρη ωρίμανση. **Δόση:** 30-40 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (12-40 κ.εκ. / στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-100 λίτρα/στρέμμα.

Μηλιά - Αχλαδιά: **Οΐδιο** (*Podosphaera leucotricha*), **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium vesicarium*), **Αλτερνάρια** (*Alternaria* spp.). Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (20-75 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-150 λίτρα/στρέμμα.

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά

καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα. **Φαιά σήψη** (*Monilia spp.*): **Δόση:** 42-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (63-75 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα. **Ωίδιο** (*Sphaerotheca pannosa*). **Δόση:** 33,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (49,5 κ.εκ./στρέμμα). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 150 λίτρα/στρέμμα.

Σπαράγγι: Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*). Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή στην ανεπτυγμένη υπέργεια βλάστηση. **Δόση:** 75 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου): Σκωρίαση (*Puccinia allii*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium sp.*). Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό σε μικρή έως μέτρια προσβολή. **Δόση:** 60-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-80 λίτρα/στρέμμα.

Πράσο (χρήση ήσσονος σημασίας): Στεμφύλιο (*Stemphylium vesicarium*), **Σκωρίαση** (*Puccinia allii*). Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι το τέλος της ανάπτυξης (το στέλεχος έχει αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία μήκος και διάμετρο). **Δόση:** 60-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-80 λίτρα/στρέμμα.

Κρεμμυδάκι Χλωρό (χρήση ήσσονος σημασίας): Ωίδιο (*Leveillulla taurica*), **Σκωρίαση** (*Puccinia allii*), **Στεμφύλιο** (*Stemphylium vesicarium*). Εφαρμογή από το στάδιο της διόγκωσης της βάσης των φύλλων μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού του υπέργειου μέρους. **Δόση:** 60-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-80 λίτρα/στρέμμα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 3/12-14

Μηλιά - Αχλαδιά: 2/7-10

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: Φαιά σήψη (*Monilia spp.*): 2/7-14, Ωίδιο (*Sphaerotheca pannosa*): 3/14

Σπαράγγι: 2/10-14

Κρεμμύδι - Σκόρδο (υπαίθρου), Πράσο (χρήση ήσσονος σημασίας), Κρεμμυδάκι Χλωρό (χρήση ήσσονος σημασίας): 1/-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του πράσου και στο χλωρό κρεμμυδάκι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες

Μηλιά - Αχλαδιά: 14 ημέρες

Ροδακινιά - Βερικοκιά - Νεκταρινιά - Κερασιά: 3 ημέρες

Σπαράγγι: -

Κρεμμύδι - Σκόρδο: 7 ημέρες

Πράσο: 14 ημέρες

Κρεμμυδάκι χλωρό: 7 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

-Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -

-Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Ως ακόλουθες καλλιέργειες να μην φυτεύονται δενδρώδεις καλλιέργειες και λαχανικά.

-Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέρχονται στις περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια εκτός αν φορούν προστατευτική ενδυμασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία μέχρι 40° C.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

- Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Μακριά από παιδιά
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Φορέστε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή.
- Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.
- Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων 50% μειωμένης διασποράς ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική.

Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Γραμμή **έκτακτης ανάγκης** Bayer

από σταθερό: **800 1135 353**

από κινητό: **210 6166 332**

24/7

Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18 - 20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr



GR80518471C





Luna[®]
EXPERIENCE

200ml e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 60.353 - 13/3/2013

LUNA EXPERIENCE SC

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/ο, tebuconazole 20% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β

Μυκητοκτόνο

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι.
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.