

ΜΙΣΤΡΑΛ 70%:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πηλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το **Mistral® 70WG** εφαρμόζεται πριν ή μετά το φύτερωμα τόσο των καλλιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του, προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με 40-50 λίτρα νερού/στρέμμα. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυθόκωμα, παράκωμα, κ.λπ.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.). Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 1/3-1/2 του απαιτούμενου νερού. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την προδιάλυση του φαρμάκου στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΚΑΡΟΤΟ: Ετήσια πηλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **50 γρ./στρ.** Μεταφυτωτικά: Εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 4 φύλλων. **ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:** Ετήσια πηλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **40 γρ./στρ.** α) Προφυτωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων, ή β) Μεταφυτωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων, μετά από αυθόκωμα ή το σχηματισμό «τραπέζιών» ή σε Μεταφυτεύσιμη τομάτα: Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπάσεις» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αυθόκωμα, η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια. **ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ:** Ετήσια πηλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **50-100 γρ./στρ.** Εφαρμογή πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας. **ΣΟΓΙΑ:** Ετήσια πηλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **75-100 γρ./στρ.** Προφυτωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά. **ΠΑΤΑΤΕΣ:** Ετήσια πηλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. α) Προφυτωτικά: Δόση: **50-100 γρ./στρ.** Εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι 3-4 ημέρες πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας, ή β) Μεταφυτωτικά: Δόση: **50 γρ./στρ.** Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών πατάτας έως το διάστημα που τα φυτά θα αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ. ή γ) Προφυτωτικά + Μεταφυτωτικά: Δόση: **50 + 50 γρ./στρ.** 1η εφαρμογή λίγο πριν το φύτερωμα της πατάτας και 2η εφαρμογή όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ. **ΜΗΔΙΚΗ:** Ετήσια πηλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **75-100 γρ./στρ.** Εφαρμογή του χειμώνα στην περίοδο ηθάργου της καλλιέργειας.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαρέα εδάφη. 2) Η **προφυτωτική** εφαρμογή στην Πατάτα συνιστάται στις ποικιλίες: Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovetik. Ειδικά για τις ποικιλίες Colmo, & Jaerla, οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρ. σε βαρεία ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρ. σε ελαφρά εδάφη. 3) Η **μεταφυτωτική** εφαρμογή στην Πατάτα συνιστάται στις ποικιλίες: Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate. 4) Η εφαρμογή του σκευάσματος στην Τομάτα, (προφυτωτικά-μεταφυτωτικά), συνιστάται στις ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell 33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromeck, ACE-55, Early

Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic, η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυθόκωμα, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρ. και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πηλτής και μπεκ τύπου σκούπας. 5) Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες Σόγιας πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτικότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα.

Καταποηεμούμενα Ζιζάνια:

Βλήτα, Λουβουδιά, Λαψάνα, Ζωχός, Αντράκλα, Περδικούλη, Άνεμις, Τάτουθας, Λάμιο, Καπνόχορτο, Κενταύριο, Χαμομήλι, Σκαρολάχανο, Οξαλής, Παπαρούνα, Ποηκόμυο, Μαρτιάκος, Αγριοσινάπι, Σαπουνόχορτο, Αγριοραδίκι, Τσουκνίδα, Βερονίκη, Πικραλίδα ή Χοιροβότανο, Αίθεπουρα, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα, Ήρα, Πόα, Σετάρια, Σκυλόχορτο, Είθευσινα, Αγκάθι, Σκυλάκι, Αγριοκαρδαμούδα, Βραχιάρα, Κομειλίνα.

Ανεθεκτικά Ζιζάνια: Αγριοβράμη, Κίραιο, Μεγάλη κολλητσιάδα, Μολόχα, Στύφνος ή αγριοτοματιά.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα και λιπάσματα.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Αποφεύγετε τη χρήση του σε αμμώδη εδάφη, σε εδάφη με περιεκτικότητα οργανικής ουσίας μεγαλύτερη από 6%.
- Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν.
- Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύντε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό.
- Κατά τους θερινούς μήνες αποφεύγετε να ψεκάσετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 60 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται στην ετικέττα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες κάτω των 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Mistral® 70WG

Metribuzin (Μετριμπουζίν) 70%
Βρέξιμοι κόκκοι

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πηλατύφυλλων ζιζανίων.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Metribuzin70% β/β
Βοηθητικές ουσίες24,73% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

A.A.D.A.: 7580/12.07.1999

Αρ. Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 ΓΡ.



Παρασκευαστής:
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpel Str. 6, 51149 Köln, Germany

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκης: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι σακούλες μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέττα όπου είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

