

ORLANDO™ 50 SC

syngenta®

Fluometuron (χημική ομάδα: Παράγωγα ουρίας)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70307/18.01.2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Fluometuron 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 55,1% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205570, Φαξ: 2111205572

**ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E., Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49, Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3**

Product names marked © or ™, are Trademarks of "ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ". The ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

5 lte

ΠΡΟΣΟΧΗ



- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Υποπο για πρόκληση καρκίνου.**
- **Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

ORLANDO™ 50 SC

syngenta®

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσετε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Αποφύγετε να αναπνεύσει συγκεντρωμένη σταγονίδια / κενερόδηλα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Φοράτε μπότες κατά την εφαρμογή. • Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τραπέζι με κλειστή καμπίνα. • Οι εργατές θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΗΛΙΘΙΩΝΤΟΣ έκθεσης: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός σπάστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηρίασης ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύντε το στομάχι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ:** 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να να προστατεύεται τα ψάρια μη στόχους να οφθαίτε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μια γεωργική γη.

Να να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτική ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση εποχίου πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστημικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμβολίζει την φωτοσύνθεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιομορφος ψεκασμός του εδάφους προσταπτικά με ενσωμάτωση ή προφυλακτικά-αμείως μετά την σπορά. Η εφαρμογή να γίνεται με μικρ τύπου ακούρας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλόμετρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινώστε καλά την διάνθρη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διπλώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδένοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα ζιζανιοκτόνα PENDIGAN 33 EC, ACTIVUS 33 EC και ORIENT 33 EC.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι: Για Ετήσια, πλατύφυλλα και αγρωστωδών ζιζάνια. Δόση: α) 200-400 κ.εκ. κκ/στρ με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτ./στρ. Χρόνος εφαρμογής: Προσταπτικά με ενσωμάτωση. 1 εφαρμογή. β) 200-400 κ.εκ.κκ/στρ με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτ./στρ. Χρόνος εφαρμογής: Προφυλακτικά αμείως μετά τη σπορά. 1 εφαρμογή. Παρατηρήσεις: 1. Η δόση είναι ανάλογη με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη. 2. Η προσταπτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται για έπρω εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή. 3. Σε 7-10 μέρες από την προσταπτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να ενεργοποιηθεί το φάρμακο. 4. Μην το χρησιμοποιείτε σε ομίχλη εδάφη. 5. Καταπολεπούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτια. Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Βήλητα, Αγριοβαμβάκι*, Λουβουδιές, Τάτουρας, Χαμομήλι, Ηλιότροπιό*, Αγριοπανίδα, Πολύκοιμη, Αντράκλι, Λάπαθο, Μαροτσάκο, Αγριο αναπλι, Αγριοτομάτα, Ζωκί, Αγριομηλιτζάνα*, Τριβήλι. Μεταρκά ευαίσθητα ζιζάνια: Χρωσόφορο, Ξεσάριες, Δοδεκάνθη, Καταπολεπούμενα καλύτερα με τη μεγάλη όση. 6. Για την καταπολέμηση και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων το Orlando 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με Pendigan 33 EC, Activus 33 EC ή Orient 33 EC.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι: Για Ετήσια, πλατύφυλλα και αγρωστωδών ζιζάνια. Δόση: 300+100 κ.εκ.κκ./στρ με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτ./στρ. Χρόνος εφαρμογής και τρόπος εφαρμογής: Εποχιοετήσιες. Παρατηρήσεις: 1) Προσταπτικά με ενσωμάτωση και 2) Προφυλακτικά. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. Καταπολεπούμενα ζιζάνια: Μουχρίτια, Βήλητα, Λουβουδιές, Τάτουρας, Αγριοτομάτα, Αγριομηλιτζάνα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Βαμβάκι: Δεν εφαρμόζεται, καλλιέργεια από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Φυτοτοξικότητα: Είναι εκλεκτική στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

Διακρίση Ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υποθεσώτε ενδοελεγκτικές πρακτικές αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανικές, καλλιηργητικές) όπου είναι εφικτό ή κάνετε επαναγωγή με ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: • σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση απόστασης της καλλιέργειας στην όρση χρσμοποίησης το σκεύασμα στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι. • σποράς ή φύτευσης των καλλιηργητικών που ακολουθούν: Μην σπενρεται και μη φυτεύεται άλλη καλλιηργητική πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όργωμα. • της προεσάρσης του ανθρώπινου ή του ζώου στην καλλιηργητική όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει σταγειώσει το ψεκαστικό υγρό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αξείωτες τελείες το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό. Ξεπλύνετε καλά, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μωα σκευάσματος (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος) το ριχνώμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια στον καταστραφών προνοσημένος με τρύπημα, για τη διάσπαρση της μιν περσσότερη χρήση, αναποθείναι σε σημεία ουλήθης, για ανοικτούχνη ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του παραβάρητα συσκευασία σε χώρο άροσρο, έπρω και καλά αεριζώμενο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

5 ltr

Product names marked ® or ™ are Trademarks of "ΑΛΦΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ". THE ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

